

Efterstær

Indledning

Ved en gråstær operation efterlades en tynd membran, som man placerer den nye kunstige linse i. Denne membran kan i ca. 10% af tilfældene blive uklar i løbet af de kommende måneder til år. Hvis uklarhederne bliver af et sådant omfang, at de påvirker synet, kan man vælge at fjerne dem ved hjælp af laser-stråler. Dette er et smertefrit og kortvarigt indgreb, som ikke kræver andet end lokal dråbe bedøvelse.

Før behandlingen

Forundersøgelse kan udføres umiddelbart før behandlingen, som ikke kræver nogen særlige foranstaltninger. Der dryppes med pupiludvidende dråber ½ time før.

Bedøvelse

De vil blive dryppet med pupiludvidende og bedøvende dråber ½ time før.

Behandlingen

Behandlingen er smertefri og tager ca. 10 min. Laserstrålen fokuseres på efterstæren og der "skydes" hul i membranen med en række skud.

Efter behandlingen

De kan tage hjem umiddelbart efter indgrebet. Der er ikke behov for efterbehandling. De kan være generet af lyset, HUSK derfor solbriller. Der kan være lidt fluer for øjet i et par uger.

Transport

De må ikke selv køre bil samme dag.

Senfølger og eventuelle komplikationer

Der kan en sjælden gang opstå nethindeløsning i efterforløbet, men risikoen anses ikke for større end ved den primære gråstær operation. Der kan opstå hævelse af den gule plet men det er yderst sjælden.

Øjenlæge / Kirurg

Susanne Tvede Andersen

Kallemosen 16

6200 Aabenraa

Tlf: 74622504 telefontid man-fre 9:00 til 11:00